P-ISSN : 2088-6012

E-ISSN : 2598-8492

JURNAL ILMU KEPERAWATAN (*Journal of Nursing Science*)

THE EFFECT OF ACUPRESSURE WRISTBAND ON NAUSEA VOMITING IN BREAST
CANCER PATIENTS WHO RECEIVED CHEMOTHERAPY

Endah Panca Lydia Fatma..... 157-164

RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT WITH PATIENT SAFETY INCIDENT
REPORT CULTURE

Wahyuni Harsul, Andi Masyitha Irwan, Elly Lilianty Sjattar..... 165-170

DIABETES SELF-CARE EXPERIENCE ON ELDERLY WITHOUT MEDICATION

Niko Dima Kristianingrum, Wiwin Wiarsih, Astuti Yuni Nursasi..... 171-180

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF NATIONAL EARLY WARNING SCORE (NEWS)
USAGE ON THE OUTCOMES OF HEAD INJURY

Laila Agustina, Abdurahman Wahid, Ifa Hafifah..... 181-194

GUIDED IMAGERY TECHNIQUES IN REDUCE BREAST CANCER PATIENT PAIN:
LITERATURE REVIEW

Sulasri, Kadek Ayu Erika, Rini Rachmawaty..... 195-201

THE INFLUENCE OF CARDIAC PULMONARY RESUSITATION (CPR) PRACTICAL
TUTORIAL TOWARD KNOWLEDGE AND MOTIVATION TO HELP THE VICTIM OF CARDIAC
ARREST IN HIGH SCHOOL STUDENT OF DARUL HIJRAH PUTERA ISLAMIC BOARDING
SCHOOL

Ahmad Lathif, Abdurahman Wahid, Ifa Hafifah..... 202-209

THE DEAD OF MILD AND MODERATE HEAD INJURY

Musyarrofah, Abdurahman Wahid, Rismia Agustina..... 210-218

AN UPDATE REVIEW: THE USE OF WET CUPPING THERAPY AGAINST VERTIGO

Nurona Azizah..... 219-229

EFFECTIVENESS OF SLOW DEEP BREATHING WITH ZIKIR TO DECREASING OF BLOOD
PRESSURE AND IMPROVING SLEEP QUALITY IN PATIENTS WITH HYPERTENSION IN THE
WORKING AREA OF GODEAN 1 PUBLIC HEALTH CENTRE OF YOGYAKARTA

Niken Setyaningrum, Suib..... 230-237

JURNAL ILMU KEPERAWATAN

(Journal of Nursing Science)

Volume 6 No. 2, November 2018

SUSUNAN REDAKSI JURNAL ILMU KEPERAWATAN

Editor Kepala

Ns. Bintari Ratih K, M.Kep

Penyunting/Editor

Ns. Tina Handayani, M.Kep

Desain Grafis

Ns. Ahmad Hasyim W., M.Kep, MN

Sekretariat

Ns. Annisa Wuri Kartika., M.Kep

Alamat Redaksi

Gedung Biomedik Lt. 2
Fakultas Kedokteran Universitas
Brawijaya
Jalan Veteran Malang 65145
Telepon (0341) 551611, 569117,
567192
Pesawat 126;
Fax (62) (0341) 564755
Email: jik@ub.ac.id
Website: www.jik.ub.ac.id

DAFTAR ISI

THE EFFECT OF ACUPRESSURE WRISTBAND ON NAUSEA VOMITING IN BREAST CANCER PATIENTS WHO RECEIVED CHEMOTHERAPY

Endah Panca Lydia Fatma.....157-164

RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT WITH PATIENT SAFETY INCIDENT REPORT CULTURE

Wahyuni Harsul, Andi Masyitha Irwan, Elly Lilianty Sjattar.....165-170

DIABETES SELF-CARE EXPERIENCE ON ELDERLY WITHOUT MEDICATION

Niko Dima Kristianingrum, Wiwin Wiarsih, Astuti Yuni Nursasi.....171-180

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF NATIONAL EARLY WARNING SCORE (NEWS) USAGE ON THE OUTCOMES OF HEAD INJURY

Laila Agustina, Abdurahman Wahid, Ifa Hafifah.....181-194

GUIDED IMAGERY TECHNIQUES IN REDUCE BREAST CANCER PATIENT PAIN: LITERATURE REVIEW

Sulasri, Kadek Ayu Erika, Rini Rachmawaty.....195-201

THE INFLUENCE OF CARDIAC PULMONARY RESUSITATION (CPR) PRACTICAL TUTORIAL TOWARD KNOWLEDGE AND MOTIVATION TO HELP THE VICTIM OF CARDIAC ARREST IN HIGH SCHOOL STUDENT OF DARUL HIJRAH PUTERA ISLAMIC BOARDING SCHOOL

Ahmad Lathif, Abdurahman Wahid, Ifa Hafifah.....202-209

THE DEAD OF MILD AND MODERATE HEAD INJURY

Musyarrofah, Abdurahman Wahid, Rismia Agustina.....210-218

AN UPDATE REVIEW: THE USE OF WET CUPPING THERAPY AGAINST VERTIGO

Nurona Azizah.....219-229

EFFECTIVENESS OF SLOW DEEP BREATHING WITH ZIKIR TO DECREASING OF BLOOD PRESSURE AND IMPROVING SLEEP QUALITY IN PATIENTS WITH HYPERTENSION IN THE WORKING AREA OF GODEAN 1 PUBLIC HEALTH CENTRE OF YOGYAKARTA

Niken Setyaningrum, Suib.....230-237

AN UPDATE REVIEW: THE USE OF WET CUPPING THERAPY AGAINST VERTIGO

Nurona Azizah

Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya

ABSTRACT

Vertigo is one of common complaints in the primary health care in the world. The common modern therapy for vertigo is using chemical pharmacological therapy yet having unwanted side effect. One of the wellknown complementary medicine that has been proven for relieving and curing many diseases is cupping therapy, especially wet cupping therapy. However, wet cupping therapy is not commonly applied in Indonesia healthcare. The causes may be due to the scarcity of the high quality scientific sources of the cupping therapy use for vertigo as well as the boundary between complementary and modern medicine in Indonesia. This review aimed to find out the use of wet cupping therapy against vertigo. A systematic review was obtained from NCBI and Google Scholar database (1999-2017) according to topic of interest. Yet Yunani, Persia, and China medicines recommend this therapy for treating vertigo as it had high level safety and effectivity. Wet cupping therapy has a potential effect in treating vertigo which the mechanism using negative pressure from vacuum cupping thus opening the skin barrier and removing causative pathology substances (CPS). Researchers and health practitioners essentially need to improve research in large scale towards the use of wet cupping against vertigo so the effectivity will be more optimal.

Keywords: Vertigo, wet cupping therapy, Persia medicine

ABSTRAK

Vertigo menjadi salah satu keluhan utama di *primary health care* di dunia. Umumnya, terapi vertigo masih mengandalkan farmakologi yang memiliki efek samping dengan efek terapeutik yang belum maksimal. Salah satu terapi komplementer umum yang direkomendasikan dan terbukti dalam meringankan hingga menyembuhkan beberapa penyakit adalah terapi bekam, khususnya bekam basah. Penggunaan bekam secara formal belum banyak diaplikasikan di pelayanan kesehatan Indonesia. Hal ini disebabkan masih langkanya publikasi ilmiah berkualitas tinggi dan masih adanya batas antara kedokteran komplementer dengan modern di Indonesia. Tinjauan pustakan ini bertujuan mengulas penggunaan terapi bekam basah terhadap vertigo. Tinjauan pustaka secara sistematis didapatkan dari database NCBI dan Google Scholar (1999-2017) yang disesuaikan dengan topik yang diangkat. Kedokteran Yunani, Persia, dan China merekomendasikan bekam basah untuk menerapi vertigo karena memiliki tingkat keselamatan dan keefektifan yang tinggi. Bekam basah memiliki efek potensial dalam menerapi vertigo dengan mekanisme pemberian tekanan negatif dari pengekupan sehingga membuka barier kulit dan mengeluarkan zat penyebab penyakit. Peneliti dan praktisi kesehatan perlu meningkatkan penelitian penggunaan bekam basah terhadap vertigo sehingga keefektifannya lebih optimal.

Kata Kunci: Vertigo, terapi bekam basah, kedokteran Persia

Jurnal Ilmu Keperawatan Vol. 6. No. 2 November 2018; Korespondensi: Nurona Azizah. Universitas Brawijaya. Fakultas Kedokteran Jurusan Keperawatan, Kode Pos 65145. Email nurona.azizah@ub.ac.id. No. Hp: 085233079840. DOI: 10.21776/ub.jik.2018.006.02.8

PENDAHULUAN

Vertigo merupakan salah satu keluhan paling umum yang terjadi pada perawatan primer (Kroenke dan Price, 1993; Bird, 1998; Kroenke dan Mangesdorff, 1989; Madlon, 1985). Beberapa artikel publikasi menyatakan penanganan medis terhadap vertigo masih sering terabaikan dan masih berbasis pengobatan (Hannelore *et al*, 2008). Pengobatan pada kasus vertigo dilaporkan memiliki beberapa efek samping yang tidak diinginkan dan tidak memiliki efek terapeutik yang diharapkan. Padahal vertigo merupakan keluhan umum yang memberatkan dan berdampak pada penurunan kualitas hidup penderita.

Saat ini terdapat beberapa alternatif penatalaksanaan vertigo yaitu prosedur reposisi *canalith* (CRP) (Thompson *et al*, 2009). CRP umumnya dilakukan pada pasien yang mengalami kasus vertigo posisi paroksismal jinak (BPPV), jenis vertigo yang merupakan gangguan vestibular paling umum terjadi pada orang dewasa. Namun efektivitasnya belum terlalu signifikan (Gordon *et al*, 2004; Pollak *et al*, 2002).

Salah satu terapi komplementer dan teknik kedokteran paling kuno adalah terapi bekam (Eloemy dan AlBedah, 2012). Terdapat beberapa jenis bekam yaitu *retained cupping*, *flash cupping*, *moving cupping*, *wet cupping*, *medicinal cupping*, dan *needling cupping*. Dari hasil metaanalisis yang dilakukan oleh Cao dkk. (2010), bekam basah (*wet cupping*) adalah jenis terapi yang paling sering digunakan. Metode bekam basah adalah dengan menggunakan kop vakum yang diletakkan di area tubuh tertentu yang telah di insisi (*pricking*)

sebelumnya sehingga menyebabkan kulit hiperemia / hemostasis dan menghasilkan efek terapeutik (Cao *et al*, 2012). Kedokteran Persia, Cina, dan Yunani menyatakan jika bekam basah direkomendasikan dalam menerapi sakit kepala dan juga vertigo (Khan *et al*, 2014). Bekam basah (*hijama* dalam Bahasa Arab) secara khusus direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadits Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa "Sebaik-baik sesuatu yang kalian gunakan untuk obat adalah bekam" (Al-Albani, 2007).

Banyak negara misalnya Norwegia, Denmark, Mesir, Jerman, Saudi Arabia, dan negara-negara Islam telah mengaplikasikan terapi bekam secara formal (Michalsen *et al*, 2009). China dan negara Timur Tengah adalah salah satu negara yang telah mengaplikasikan bekam basah di rumah sakit. Negara Jerman, Norwegia, dan Denmark saat ini telah berusaha mengkombinasikan terapi komplementer dengan terapi kedokteran (Laila *et al*, 2011). Di layanan kesehatan Indonesia, perkembangan penggunaan terapi bekam basah belum begitu terlihat meskipun tingkat kemananan penggunaannya memiliki tingkat keamanan yang tinggi (Scallan *et al*, 2015; El Sayed *et al*, 2013). Cao dkk. (2011) melakukan studi metaanalisis dan mengkaji 135 artikel penelitian *Randomized Controlled Trial* (RCT) yang dipublikasikan dari tahun 1992 – 2010. Hasilnya adalah bekam basah yang paling sering digunakan dari terapi bekam lainnya untuk menerapi penyakit dan menunjukkan tidak adanya efek samping serius yang dialami selama masa studi dan dalam jangka panjang setelah proses pembekaman (Chao *et al*, 2012).

Pengobatan tradisional China (TCM) dan Persia memiliki landasan jika penyebab penyakit terjadi akibat ketidakseimbangan antara berbagai elemen, misalnya pada TCM yang dikenal dengan Ying dan Yang (materi yang menyusun tubuh), Qi (energi vital), Jing (dasar materi sebagai pembentukan tubuh sebelum dan sesudah lahir), Xue (Darah), dan Jin Ye (cairan tubuh) (Ridho, 2015). Berhubungan dengan landasan diatas, TCM dan pengobatan Persia dalam mendiagnosa sebuah penyakit, tidak hanya memperhatikan apa yang terjadi di dalam tubuh, namun juga apa yang terjadi di seluruh bagian dalam tubuh. Kedua metode pengobatan ini juga melihat bagaimana tubuh menanggapi rangsangan eksternal dan lingkungan. Pengobatan TCM dan Kedokteran Persia bukan bertujuan menyembuhkan gejala tertentu, namun lebih berfokus terhadap pemulihan keseimbangan tubuh dan menekankan perlunya memiliki gaya hidup sehat dan bergizi. Bekam basah untuk menerapi vertigo yang diaplikasikan saat ini menggunakan prinsip kedokteran Persia yang dapat dikombinasikan dengan TCM (Kordafshari *et al*, 2017; Chao *et al*, 2012).

Meskipun banyak artikel merekomendasikan vertigo dapat diterapi dengan bekam basah dan direkomendasikan oleh Kedokteran Yunani dan China, namun publikasi artikel ilmiah yang disediakan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia masih sangat langka. Berdasarkan hal tersebut, penulis membahas lebih lanjut tentang penggunaan bekam basah dalam menerapi vertigo.

METODE

Tinjauan pustaka ini menggunakan artikel-artikel ilmiah yang dibatasi menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan kata kunci *hijama*, *cupping therapy*, *wet cupping*, *wet cupping therapy*, *vertigo issue*, *vertigo*, *penatalaksanaan vertigo di Indonesia*, *treatment of vertigo*, *cupping therapy for vertigo*, *hijama for vertigo*, dan *methods of wet cupping*. Kami menggunakan database dari NCBI dan Google Scholar, ditambahkan dengan buku. Bahasan tinjauan pustaka pada studi ini terdiri dari (1) informasi dasar studi; (2) deskripsi intervensi umum vertigo; (3) definisi dan penyebab dari vertigo; dan (4) terapi bekam basah untuk vertigo.

HASIL

Informasi Dasar Studi

Masih sedikit yang meneliti keberhasilan terapi bekam untuk vertigo walaupun telah umum jika bekam basah memiliki efek yang diharapkan dalam mengatasi pasien dengan vertigo (Kordafshari *et al*, 2017; Liao, 2009; Liang, 2009; Ai-Ping, 2004). Mayoritas artikel ilmiah yang mengkaji efek bekam basah untuk vertigo menggunakan bahasa China, Persia, dan Bahasa Arab (Jorjani, 2011; Avicenna, 2010; Liang, 2009; Liao, 2009; Arzani, 2008; Chashti, 2008; Shirazi, 2008; Jorjani, 2005; Ai-Ping, 2004). Hanya terdapat sedikit artikel ilmiah yang menjelaskan metode dan keefektifan penatalaksanaan bekam basah terhadap vertigo, sedangkan pada masalah kepala lain telah banyak diaplikasikan dengan keberhasilan dan keamanan yang tinggi. Beberapa artikel

ilmiah telah melakukan meta-analisis terkait keberhasilan terapi bekam basah terhadap banyak penyakit. Mekanisme bekam basah dalam memberikan efek terapeutik juga telah dibahas secara detail dari segi pathogenesis.

Definisi dan Penyebab dari Vertigo

Menurut kedokteran Persia, vertigo adalah kondisi dimana pasien merasakan semua benda berputar di sekelilingnya. Dalam kasus ini, pasien tetap akan jatuh dan tidak konstan walaupun dalam kondisi duduk (Kordafsari *et al*, 2017). Penegakan diagnosis dan terapi adalah dengan melihat 4 jenis cairan (*humoral theory*) yaitu darah (*blood*), mukus (*phlegm*), empedu hitam (*black bile*), dan empedu kuning (*yellow bile*) (Zargarani *et al*, 2013). Beberapa penyebab vertigo umum yang mendasari adalah (Kordafshari *et al*, 2017):

- (1) Akumulasi dalam dari cairan abnormal berdensitas rendah yang bersuhu dingin atau panas atau adanya substansi patologi didalam ventrikel atau duktus otak. Vertigo dapat terjadi jika terdapat cairan yang terakumulasi dan menuju di dalam otak pada kondisi apapun. Vertigo dibagi menjadi 4 jenis yang didasarkan pada karakteristik dari cairan abnormal yang terakumulasi:
 - (a) Cairan yang terakumulasi karena darah
 - (b) Cairan yang terakumulasi karena mukus
 - (c) Cairan yang terakumulasi karena empedu hitam
 - (d) Cairan yang terakumulasi karena empedu kuning
- (2) Akumulasi "angin padat" yang banyak dan mengalir ke ventrikel dan duktus otak. Angin adalah istilah yang paling sulit dipahami oleh kedokteran modern, khususnya saat mempertimbangkan pemberian terapi alternatif. Angin berdampak pada tubuh sama seperti angin yang menggerakkan ranting dan

dedaunan yang nantinya berdampak pada pohon. Angin diperkirakan awalnya muncul di bagian tubuh paling atas dan lebih luar, khususnya pada daerah wajah, kulit, kelenjar keringat, dan paru-paru (Dashtdar *et al*, 2016).

Menurut kedokteran China, ketika tubuh diserang angin dari luar, pertahanan tubuh akan melemah, menyebabkan ketidakstabilan dalam pembukaan dan penutupan pori-pori di seluruh tubuh, yang memicu invasi faktor patogen lainnya yang menyebabkan penyakit dengan gejala seperti sakit kepala, hidung tersumbat, nyeri dan gatal tenggorokan, pembengkakan wajah, "masuk angin", dan masalah keringat (Dashtdar *et al*, 2016). Sedangkan menurut kedokteran Persia, angin memainkan peran penting di saluran organ pelvis untuk memfasilitasi fungsi ekskretoris, seperti buang air kecil, buang air besar, dan ereksi / ejakulasi dalam kondisi fisiologis (Latifi *et al*, 2014).

- (3) Akumulasi cairan abnormal yang terkonsentrasi dan bersifat dingin didalam duktus dan "pori-pori" otak.
- (4) Menurut kedokteran Persia, angin dan cairan abnormal bukan berasal dari otak namun terakumulasi di organ lain seperti sistem gastro, uterus, dan ginjal. Cairan abnormal juga dipercaya menghasilkan gas/ uap yang toksik dan dapat menuju ke otak sehingga menyebabkan vertigo. Jenis vertigo ini digolongkan berdasarkan letak dari angin yang terakumulasi atau cairan abnormal :
 - (a) Angin atau cairan abnormal yang berada di sistem gastro
 - (b) Angin atau cairan abnormal yang berada di arteri temporal, arteriol dibelakang telinga dan vena jugularis
 - (c) Angin atau cairan abnormal yang berada di uterus, ginjal, kandung kemih, atau ekstremitas bawah.
- (5) Trauma kepala
- (6) Dystemperament sederhana otak yang disebabkan oleh cuaca panas atau dingin (bukan karena akumulasi panas atau dingin)
- (7) Gerakan kepala yang berputar, menari, dan melihat hal-hal yang berputar dengan cepat

- (8) Kelemahan umum disebabkan oleh berbagai penyakit
- (9) Lainnya

Deskripsi Intervensi Umum Vertigo

Manajemen vertigo di RS Indonesia didasarkan pada lama keluhan, ketidaknyamanan akibat gejala yang timbul, serta patologi yang mendasari. Umumnya dokter akan memberikan medikamentosa dengan tujuan utamanya (i) mengeliminasi keluhan vertigo, (ii) memperbaiki proses-proses kompensasi vestibuler, dan (iii) mengurangi gejala-gejala neurovegetatif ataupun psikoafektif (Wahyudi, 2012). Pengobatan yang digunakan misalnya vestibular suppressants, antiemetics, dan benzodiazepines masih memiliki keterbatasan dalam hal efek samping dan ketidakefektifan dalam mengontrol penyakit secara komplit (Kordafshari et al, 2017).

Tenaga kesehatan juga dapat menggunakan prosedur reposisi yang dikenal dengan *canalith repositioning procedures* (CRP) atau dikenal dengan *Epley maneuver* pada pasien *Benign Paroxysmal Positional Vertigo* (BPPV). Pada BPPV, terdapat partikel canalith yang terlepas dari rongga telinga dalam (*utricle*) ke cairan telinga dalam atau di *semicircular canals*. Cairan ini berfungsi sebagai titik keseimbangan, sehingga adanya canalith akan mengganggu keseimbangan dan timbul vertigo. Prinsip CRP adalah mereposisi canalith ke tempat semula yaitu di *utricle* dengan menggunakan gaya gravitasi (Riga et al, 2011; Gordon et al, 2004).

Saat ini, keterbatasan CRP adalah masih belum adanya studi yang secara jelas menjabarkan jumlah sesi CRP yang tepat,

waktu yang tepat, dan berapa lama CRP dilakukan untuk menghilangkan tanda gejala BPPV. Sebuah studi retrospektif dengan menggunakan 69 pasien BPPV membutuhkan waktu 5,07 hari untuk menerapkan BPPV dengan vestibular neuritis dan 2,28 hari untuk BPPV dengan penyakit Meniere (Lee et al, 2010). Manuver CRP satu waktu belum cukup menghilangkan tanda gejala, dan beberapa kali manuver CRP juga belum mampu menunjukkan perubahan signifikan antara kelompok BPPV sekunder dengan idiopatik (Gordon et al, 2008; Pollak et al, 2002). Dengan demikian, rumah sakit di Indonesia maupun pelayanan kesehatan formal membutuhkan pemahaman terkait jenis terapi alternatif yang memiliki keberhasilan tinggi sehingga diharapkan mampu menurunkan tingkat morbiditas penderita vertigo mengingat vertigo tergolong masalah kompleks.

Terapi Bekam Basah Untuk Terapi Vertigo

Bekam basah adalah metode dengan menggunakan kop vakum yang diletakkan di area tubuh yang telah di insisi (*pricking*) sebelumnya. Pengekopian dilakukan dengan cara alat hisap (*suction machine*) atau dengan bara api (El Sayed et al, 2013, 2014). Prinsip tindakan bekam basah secara ilmiah lebih direkomendasikan menggunakan sunah Nabi Muhammad daripada metode modern yang dilakukan di beberapa negara Eropa. Saat ini Kedokteran Tradisional China mengadopsi prinsip bekam yang diaplikasikan di negara-negara Arab / Kedokteran Persia karena memiliki efek terapeutik yang lebih besar (El Sayed et al, 2013; Huang, 2008).

Prosedur bekam basah memiliki lima tahap dan membutuhkan waktu 15 – 20 menit (Ahmadi *et al*, 2008):

- (1) Penghisapan pertama. Kop ditempatkan di titik tubuh sesuai dengan penyakit dan pengekokan dibantu dengan alat hisap. Kop dibiarkan menempel di kulit selama 3 – 5 menit.
- (2) Insisi. Kop dilepas dan dibuat insisi superfisial (2 milimeter) pada area yang dikop dengan menggunakan pisau bedah (15–22 *gauge surgical blades*)
- (3) *Bloodletting*. Kop ditempatkan kembali seperti poin 1 hingga kop terisi darah dari pembuluh kapiler.
- (4) *Removal*. Kop dilepas, dan proses diulang 1 – 3 kali.
- (5) *Dressing*.

Dalam menerapi vertigo, kedokteran Persia tidak hanya menggunakan terapi bekam, namun terdapat beberapa kondisi yang membutuhkan terapi pendamping yaitu dengan plebotomi (membuat sayatan di pembuluh darah vena pada area tertentu sehingga beberapa darah akan dikeluarkan dari tubuh). Aplikasi bekam basah dan plebotomi diaplikasikan pada area-area tubuh yang berbeda tergantung pada jenis vertigo yang dialami. Kordafshari dkk. (2017) menjabarkan secara terperinci terkait lokasi bekam basah dan plebotomi dalam menerapi vertigo, sebagai berikut:

- (1) Apabila vertigo disebabkan oleh trauma atau injuri kepala, bekam basah direkomendasikan untuk diaplikasikan diantara dua skapula dan plebotomi diaplikasikan pembuluh darah vena di kaki.
- (2) Vertigo yang disebabkan dari otak [**Topik Definisi dan Penyebab Vertigo nomor 1-3**], bekam basah direkomendasikan untuk diaplikasikan di daerah kepala dan juga ditempatkan pada vertebrae servikalis kedua dan ketiga. Jenis vertigo ini juga direkomendasikan untuk diaplikasikan

plebotomi pada pembuluh darah vena dibelakang telinga atau pembuluh darah vena dibelakang leher.

- (3) Vertigo yang disebabkan oleh terakumulasinya darah abnormal [**Topik Definisi dan Penyebab Vertigo nomor 1a**], bekam basah direkomendasikan untuk diaplikasikan di kaki, oksiput, vertebrae servikalis kedua dan ketiga. Plebotomi direkomendasikan untuk diaplikasikan di vena sefalik, vena dibelakang telinga, vena dibelakang leher, atau di vena safena.
- (4) Vertigo yang disebabkan oleh terakumulasinya cairan empedu hitam abnormal [**Topik Definisi dan Penyebab Vertigo nomor 1c**], bekam basah direkomendasikan untuk diaplikasikan di vertebrae servikalis kedua dan ketiga; dan oksiput.
- (5) Vertigo yang disebabkan oleh terakumulasinya cairan empedu kuning abnormal [**Topik Definisi dan Penyebab Vertigo nomor 1d**], bekam basah direkomendasikan untuk diaplikasikan di vertebrae servikalis kedua dan ketiga; dan oksiput. Plebotomi direkomendasikan untuk diaplikasikan di vena sefalika dan vena dibelakang telinga.
- (6) Vertigo yang disebabkan oleh terakumulasinya angin padat yang banyak [**Topik Definisi dan Penyebab Vertigo nomor 2**], plebotomi yang direkomendasikan di vena sefalika.
- (7) Vertigo yang disebabkan oleh terakumulasinya angin dan cairan pada vena jugularis, jantung, hati, atau limpa [**Topik Definisi dan Penyebab Vertigo nomor 4**]; bekam basah direkomendasikan untuk diaplikasikan di daerah oksiput dan kaki.
- (8) Vertigo yang disebabkan oleh terakumulasinya angin dan cairan yang berasal dari organ uterus, ginjal, dan ekstremitas bawah, bekam basah [**Topik Definisi dan Penyebab Vertigo nomor 4**] direkomendasikan untuk diaplikasikan diantara dua skapula. Plebotomi diaplikasikan di vena dari organ yang terlibat. Plebotomi dari vena safena direkomendasikan jika vertigo berasal dari organ uterus.

PEMBAHASAN

Kedokteran Persia merekomendasikan plebotomi dan bekam basah karena termasuk komponen utama untuk menerapkan vertigo. Kedokteran Persia merekomendasikan area-area berbeda untuk penatalaksanaan plebotomi maupun bekam basah karena penatalaksanaannya berdasarkan dari penyebab vertigo. Pada kasus vertigo, pengaplikasian plebotomi di pembuluh darah vena sefalika diaplikasikan terlebih dahulu dan dilanjutkan di plebotomi vena lain, misalnya pada vertigo yang penyebabnya berasal dari otak [**Topik Definisi dan Penyebab Vertigo nomor 1-3**], dan juga plebotomi di daerah vena dibelakang telinga harus dikerjakan setelah plebotomi vena sefalika. Kedokteran Persia percaya bahwa pengaplikasian plebotomi dibelakang telinga berhubungan dengan lokasi tersebut yang merupakan cabang vena jugularis eksternal (Kordafshari *et al*, 2017). Plebotomi pada vena dibelakang telinga merupakan terapi paling sesuai dan terbaik untuk menerapkan segala jenis vertigo.

Bekam basah di daerah vertebrae servikalis kedua dan ketiga dan didaerah oksiput adalah bagian terpenting dalam bekam basah untuk vertigo yang penyebabnya berasal dari otak [**Topik Definisi dan Penyebab Vertigo nomor 1-3**], sedangkan bekam basah didaerah kaki direkomendasikan untuk jenis vertigo dengan penyebab cairan darah yang abnormal [**Topik Definisi dan Penyebab Vertigo nomor 1a**]. Beberapa penelitian telah membuktikan jika terapi bekam basah di daerah oksipital akan bermanfaat pada vertigo servikal, dan telah direkomendasikan

oleh kedokteran Persia dan kedokteran Yunani (Khan *et al*, 2014).

Penggunaan plebotomi dalam menerapkan vertigo masih menuai pro dan kontra. Dr. Feroz Usman Latib (2013) menyatakan jika plebotomi umumnya diambil dari vena hipodermik dan akan mengurangi panas dari bagian dalam tubuh, sehingga akan kurang bermanfaat apabila diaplikasikan di negara tropis atau negara yang sedang musim kemarau, dan karenanya tidak dipraktikkan oleh Nabi (SAW) (Latib, 2013). Namun dari hasil metaanalisa Cao dkk. (2012) menyatakan jika keefektifan terapi bekam akan lebih meningkat secara signifikan apabila dikombinasikan dengan terapi lain, misalnya dengan akupunktur. Contohnya pada kasus paralisis didaerah wajah diketahui jika kombinasi antara terapi bekam basah dengan akupunktur memiliki dampak yang lebih baik daripada hanya dengan akupunktur. Sebagai tambahan, kombinasi terapi bekam dengan pengobatan modern ternyata memiliki dampak terapeutik yang lebih signifikan dibandingkan dengan pengobatan modern saja (misalnya obat-obatan). Sehingga peneliti yang tertarik di bidang komplementer perlu melakukan banyak penelitian terkait efektifitas kombinasi bekam basah dengan pengobatan modern berhubungan dengan besarnya dampak yang akan diperoleh.

Mekanisme bekam basah untuk menerapkan penyakit telah dianalisis secara rinci dari segi patogenesis oleh El Sayed dkk (2013). Secara garis besar, terapi bekam basah merupakan prosedur bedah minor yang membersihkan darah dan cairan interstisial dari substansi penyebab penyakit (*causative pathology sub-*

stance yang disingkat dengan CPS). Bekam basah akan membuka barier kulit, meningkatkan fungsi ekskretori alami pada kulit, meningkatkan imunitas dan cairan interstisial pada kedua ujung kapiler yang membersihkan darah dari CPS selama beberapa detik. Manfaat bekam basah pada saat pengekapan menyebabkan adanya kompresi vaskular yang akan menurunkan suplai darah ke kulit selama beberapa menit dan berdampak pada terakumulasinya senyawa kimia vasodilator. Saat kompresi vaskular dihilangkan, aliran darah ke kulit secara signifikan akan meningkat sehingga terjadi hiperemia. Hal ini menyebabkan sirkulasi darah lebih banyak menuju kulit yang akan terfiltrasi dan dibersihkan pada pengekapan kedua setelah lokasi pengekapan pertama dilakukan insisi (2 mm).

Pada kondisi patologis, lokalisasi dari substansi pro-inflamasi, sel inflamasi, toksin, bakteri, dan substansi biologis dan kimia yang berbahaya umumnya terjadi pada tempat spesifik dan berbeda menurut jenis penyakit dan fase patologis. Pada lokalisasi tersebut, bekam basah akan memfasilitasi drainase, pengeluaran CPS, dan menurunkan volum cairan yang berlebih dari tekanan yang diberikan kepada cairan interstisial di ruang interstisial. Kulit memiliki fungsi menyekresi banyak toksin yang berasal dari obat, logam berat, bahan kimia dan senyawa toksik endogen. Hal yang menghalangi pengeluaran zat-zat toksik dari kulit karena adanya barier kulit maupun luka. Dengan demikian, terapi bekam sangat bermanfaat karena membuka barier kulit dan meningkatkan peran ekskresi dari kulit. Pada saat pengekapan pertama, akan terjadi akumulasi cairan (cairan jaringan + cairan terfiltrasi + sel darah yang

terhemolisis + zat terlarut terfiltrasi) yang mengandung toksin (limbah) dan sel darah terhemolisis di area kulit yang menyebabkan dilusi dan redistribusi lokal mediator nosiseptif. Contoh dari mediator nosiseptif adalah substansi P (neuropeptida dilepaskan dari ujung saraf yang berhubungan dengan rasa sakit), mediator inflamasi dan prostaglandin. Substansi terdilusi dari mediator nosiseptif yang bercampur dengan cairan limbah dari jaringan maupun terfiltrasi akan terakumulasi pada kulit yang terangkat yang diakibatkan oleh pengekapan pertama dan akan dikeluarkan pada pengekapan kedua setelah insisi.

Walaupun penelitian terkait bekam basah terhadap vertigo masih tergolong langka, namun jika dilihat dari *International Classification of Headache Disorders* (2016), terdapat kriteria vertigo yang berhubungan dengan migraine yang dikenal dengan vestibular migraine [38]. Dalam beberapa penelitian ditemukan jika 22 – 76 % penderita penyakit Meniere's mengalami vestibular migraine (Yoon-Hee Cha, 2007). Ishiyama dkk. (2000) menyatakan jika 247 pasien BPPV idiopatik mengalami migrain 3 kali lebih sering daripada BPPV sekunder yang disebabkan oleh trauma atau pembedahan. Sedangkan beberapa studi manfaat bekam basah terhadap migraine telah cukup banyak dipublikasikan (Ishiyama *et al*, 2000). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi dkk. (2008), 95% pasien yang diterapi bekam basah lengkap dari 63 pasien dengan sakit kepala berat menunjukkan respon positif terhadap terapi (Ahmadi *et al*, 2008). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Duo (1999) juga menemukan hasil yang serupa. Duo meneliti pada 100 pasien dengan

sakit kepala berat di China dan dilakukan terapi bekam basah yang dikombinasikan dengan akupunktur. Sebesar 94% melaporkan hasil positif. Studi lain yang dilakukan oleh Azizkhani (2000) yang menerapi pasien sakit kepala migraine dan non-migraine. Azizkhani mendapatkan keberhasilan terapi bekam basah terhadap sakit kepala berat migraine sebesar 91,8% dan terhadap sakit kepala non migraine sebesar 89% (Azizkhani, 2000; Duo, 1999). Untuk lokasi bekam basah dari studi tersebut diaplikasikan di antara dua skapula, pada lokasi T1 – T3 tulang belakang skapula (Ahmadi et al, 2008).

PENUTUP

Aplikasi bekam basah telah berkembang pesat di dunia. Namun penatalaksanaan secara formal di Indonesia belum terlalu umum diaplikasikan meskipun telah banyak publikasi artikel ilmiah terkait keefektifan dan keamanan bekam basah. Masih langkanya publikasi artikel ilmiah tentang keefektifan dan metode bekam basah yang tepat dalam menerapi vertigo menjadi urgensi besar untuk diteliti dan ditelaah oleh peneliti dan praktisi kesehatan di Indonesia demi mewujudkan efek terapeutik yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali Ridho. *Bekam sinergi: Rahasia sinergi pengobatan Nabi, modicine modern, dan Traditional Chinese Medicine*. Solo: Aqwam; 2015.
- Aghili Khorasani Shirazi MH. *Moalejat e aghili*. Vol. 1. Tehran, Iran: Iran University of Medical Sciences Press; 2008.
- Ai-Ping W. Research progress of acupuncture in treating cervical vertigo. *J Acupunct Tuina Sci*. 2004; 2:57-60.
- Al-Albani. *Sahih and daeef sonan Abo Dawood, Book of medicine*. Riyadh, Saudi Arabia: Dar Al-Maarif library; 2007.
- Alireza Ahmadi, David C. Schwebel, and Mansour Rezaei. The Efficacy of Wet-Cupping in the Treatment of Tension and Migraine Headache. *The American Journal of Chinese Medicine*. 2008; 36(1): 37– 44.
- Arzani MA. *Teb-e-Akbari [Akbari's Medicine]*. Vol. 1. Qom, Iran: Jalaaladdin Press; 2008.
- Avicenna. *Qanoon fi al Tib [Canon of Medicine]*. Vol. 3. Beirut, Lebanon: Ehyaol Toras al-Arabi Press; 2010.
- Azizkhani, M. *The Efficacy of Hejamat in Treatment of Migraine* (in Farsi). Tehran: The Hejamat Research Institute of Iran; 2000.
- Bird JC. An analysis of referral patterns for dizziness in the primary care setting. *Br J Gen Pract*. 1998; 48(437): 1828-1832.
- C. R. Gordon, R. Levite, V. Joffe, N. Gadoth, Is posttraumatic benign paroxysmal positional vertigo different from the idiopathic form? *Archives of Neurology*. 2004; 61(10): pp. 1590–1593.
- Chashti MA (Nazem Jahan). *Exir e Azam [Great Elixir]*. Vol. 1. Tehran, Iran: Research Institute for Islamic and Complementary Medicine; 2008.
- Duo, X. 100 cases of intractable migraine treated by acupuncture and cupping. *J. Tradit. Chin. Med*. 1999; 19: 205–206.

- El Sayed SM, Mahmoud HS, Nabo MMH. Methods of Wet Cupping Therapy (Al-Hijamah): In Light of Modern Medicine and Prophetic Medicine. *Altern Integ Med*. 2013; 2: 111. doi:10.4172/2327-5162.1000111
- Elolemy AT, AlBedah AMN. Public knowledge, attitude and practice of complementary and alternative medicine in Riyadh region, Saudi Arabia. *Oman Med J*. 2012; 27: 20e26.
- Feroz Osman-Latib. *Islamic Cupping & Hijamah: A Complete Guide*. South Africa: EDI Publishers; 2013.
- Gholamreza Kordafshari, Mohammad Reza Shams Ardakani, Mansoor Keshavarz, Mohammad Mehdi Esfahani, Esmaeil Nazem, Maryam Moghimi, Arman Zargaran, Hoorieh Mohammadi Kenari. The Role of Phlebotomy (Fasd) and Wet Cupping (Hijamat) to Manage Dizziness and Vertigo From the Viewpoint of Persian Medicine. *Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine*. 2017; 22(3): 369-373. doi: 10.1177/2156587216672757
- H. Lee, J. H. Ban, K. C. Lee, and S. M. Kim, "Benign paroxysmal positional vertigo secondary to inner ear disease," *Otolaryngology—Head and Neck Surgery*. 2010; 143(3): pp. 413–417.
- Hannelore K. Neuhauser, Andrea Radtke, Michael von Brevern, Franziska Lezius, Maria Feldmann, Thomas Lempert. Burden of dizziness and vertigo in the community. *Arch Intern Med*. 2008; 168(19): 2118-2124.
- Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. 2016. The International Classification of Headache Disorders 3rd edition (Beta version). Tersedia dari: <https://www.ichd-3.org/> [Diakses 21 Desember 2017].
- Huang YL. Cupping-bloodletting therapy of Saudi Arabia and its clinical application. *Zhongguo Zhen Jiu*. 2008; 28: 375-377.
- Huijuan Cao, Xun Li, Jianping Liu. An Updated Review of the Efficacy of Cupping Therapy. *PLoS ONE*. 2012; 7(2). doi:10.1371/journal.pone.0031793
- Ishiyama, K. M. Jacobson, and R. W. Baloh. Migraine and benign positional vertigo. *Annals of Otology, Rhinology and Laryngology*. 2000; 109(4): pp. 377–380.
- Jorjani I. *Zakhireye Kharazmshahi [Treasure of the Khwarazm Shah]*. Qom, Iran: Jaleleddin Press; 2011.
- Jorjani I. *Al-Aghraz al-Tebbieh va al-Mabahas al-Alayieh [Medical Pursuits]*. Tehran, Iran: Tehran University Press; 2005.
- Khan JA, Siddiqui MA, Itrat M, Jamal MA. A review on therapeutic application of Fasd (venesection) in Unani medicine. *J Biol Sci Opin*. 2014; 2: 101-102.
- Kroenke K, Mangelsdorff AD. Common symptoms in ambulatory care: incidence, evaluation, therapy, and outcome. *Am J Med*. 1989; 86(3): 262-266.
- Kroenke K, Price RK. Symptoms in the community: prevalence, classification, and psychiatric comorbidity. *Arch Intern Med*. 1993; 153(21): 2474-2480.
- Kupiya Timbul Wahyudi. Tinjauan Pustaka: Vertigo. *Cermin Dunia Kedokteran*. 2012; 39(10).

- L. Pollak, R. A. Davies, and L. L. Luxon, "Effectiveness of the particle repositioning maneuver in benign paroxysmal positional vertigo with and without additional vestibular pathology," *Otology and Neurotology*. 2002; 23(1): pp. 79–83.
- Laila J Salomonsen, Lasse Skovgaard, Søren la Cour, Lisbeth Nyborg, Laila Launsø, Vinjar Fønnebø. Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals. *BMC Complement Altern Med*. 2011; 11: 4.
- Latifi SA, Minaiee B, Kamalinejad M, Nazem E, Gooran S. Complementary treatment in chronic pelvic pain syndrome: a case report study. *Iran Red Crescent Med J*. 2014;16:e13681.
- Liang SY. Wet cupping therapy plus massage on treatment of 50 cases with pivot joint disturbance vertigo [in Chinese]. *Fujian Journal of Traditional Chinese Medicine*. 2009; 40(1): 28–29.
- Liao FR. Observations on the efficacy of pricking bloodletting plus cupping in treating cervical vertigo [in Chinese]. *Shanghai Journal of Acupuncture and Moxibustion*. 2009; 28: 399–400.
- M. Riga, A. Bibas, J. Xenellis, and S. Korres. Review Article: Inner Ear Disease and Benign Paroxysmal Positional Vertigo: A Critical Review of Incidence, Clinical Characteristics, and Management. *Hindawi Publishing Corporation International Journal of Otolaryngology*. 2011; 2011. doi:10.1155/2011/709469.
- Madlon-Kay DJ. Dizziness: state of the science. *J Fam Pract*. 1985; 21(2): 109–113.
- Mehrab Dashtdar, Mohammad Reza Dashtdar, Babak Dashtdar, Karima Kardi, Mohammad khabaz Shirazi. The Concept of Wind in Traditional Chinese Medicine. *Journal of Pharmacopuncture*. 2016; 19[4]:293-302.doi: <https://doi.org/10.3831/KPI.2016.19.030N>.
- Michalsen A, Bock S, Lüdtke R, Rampp T, Baecker M, Bachmann J, Langhorst J, Musial F, Dobos GJ. Effects of traditional cupping therapy in patients with carpal tunnel syndrome: A randomized controlled trial. *J Pain*. 2009; 10: 601-608.
- Salah Mohamed El Sayed, Abdel-Salam Al-quliti, Hany Salah Mahmoud, Hussam Baghdadi, Reham A. Maria, Manal Mohamed Helmy Nabo, Ahmad Hefny. Therapeutic Benefits of Al-hijamah: in Light of Modern Medicine and Prophetic Medicine. *American Journal of Medical and Biological Research*. 2014; 2(2): 46-71. doi:10.12691/ajmbr-2-2-3
- Scallan J, Huxley VH, Korthuis RJ. *Capillary fluid exchange: Regulation, functions, and pathology*. In: *The interstitium*. San Rafael (CA): Morgan & Claypool Life Sciences; 2010.
- Timothy L. Thompson, Ronald Amedee. Vertigo: A review of common peripheral and central vestibular disorders. *The Ochsner Journal*. 2009; 9:20–26.
- Yoon-Hee Cha. Migraine Associated Vertigo. *Journal of Clinical Neurology*. 2007;3.
- Zargaran A, Zarshenas MM, Karimi A, Yarmohammadi H, Borhani-Haghighi A. Management of stroke as described by Ibn Sina (Avicenna) in the Canon of Medicine. *Int J Cardiol*. 2013; 169: 233-237.